


DIAGNÓSTICO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

I - INTRODUÇÃO: TVP é doença de freqüente ocorrência e principal fonte causadora de Embolia Pulmonar. Seu diagnóstico pode ser objetivamente realizado usando-se critérios clínicos e de antecedentes e, conforme pontuação, associação a D-Dímero para decisão da necessidade ou não de exame de imagem ultrassonográfico. O acerto no diagnóstico (comprovar ou afastar) é importante pois tanto prevenirá eventos trombo-embólicos quanto prevenirá expor o paciente a terapia anticoagulante desnecessária.^{1,2}

II – Grau de Recomendação: Grau 1B

III - ALGORITMO: (Adaptado de Wells¹)



IV - CONCLUSÃO: O diagnóstico de TVP pode ser conduzido de forma racional para confirmação ou afastamento, com associação da clínica, antecedentes, D-dímero e US.

V – REFERÊNCIAS: (*Leitura recomendada)

1. Wells, PS The role of qualitative D-Dimer Assays, Clinical Probability and Noninvasive Imaging Tests for the Diagnosis of Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism, Seminar Vasc Med 5(4):340-50, 2005

2. Wells, PS et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. NEJM, 2003; 349:1227-35.